

L'RSV è un **virus stagionale**.
In Italia, la stagione di RSV dura in media 5 mesi,
con un picco tra **gennaio** e **febbraio**.¹⁰

Tutti i bambini sono a rischio indipendentemente se nati durante la stagione dell'RSV. Infatti, circa il 54% dei bambini ospedalizzati per RSV è nato prima dell'inizio della stagione epidemica.¹¹

APR*	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR
Immunizzazione idealmente prima dell'inizio della stagione di RSV						Immunizzazione alla nascita durante la stagione di RSV					
 Pediatri di famiglia  Centri vaccinali						 Punti nascita  Pediatri di famiglia  Centri vaccinali					

 Stagione di RSV

*Sulla base dei dati epidemici, l'immunizzazione può essere estesa anche ai bambini ad aprile.¹²

Immagine al solo scopo illustrativo.
Elaborazione grafica di dati da testo, Rif. 12,13.

NEONATI NATI PRIMA DELLA STAGIONE

I bambini nati fuori stagione di RSV sono esposti al rischio del virus per l'intera stagione (5 mesi)¹⁴

NEONATI PIÙ PICCOLI NATI DURANTE LA STAGIONE

I bambini nati durante la stagione di RSV, sebbene esposti a meno mesi di RSV, risultano a rischio perché più piccoli¹⁴



Per qualsiasi dubbio inerente alla salute del tuo bambino, rivolgiti al tuo pediatra di fiducia.

Se vuoi avere maggiori informazioni sull'RSV o la bronchiolite, visita il sito:
www.togetheragainstrsv.it



Bibliografia: **1.** Simoes EA. Lancet. 1999; 354 (9181): 847-52. **2.** Piedimonte G et al. Pediatr Rev. 2014; 35 (12): 519-30. **3.** Hall CB et al. Pediatrics. 2013; 132 (2): e341-8. **4.** Bianchini S et al. Microorganism. 2020; 8 (12): 2048. **5.** Meissner HC. N Engl J Med. 2016; 374 (1): 62-72. **6.** Groves HT et al. mBio. 2020; 11 (1): e03236-19. **7.** Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Virus Respiratorio Sinciziale (VRS). Disponibile all'indirizzo: <https://www.ospedalebambinogesu.it/virus-respiratorio-sinciziale-vrs-134145/> (ultimo accesso: marzo 2026). **8.** Griffin MP et al. N Engl J Med. 2020; 383 (5): 415-425. **9.** Centers for Disease Control and Prevention (CDC). How RSV Spreads. Disponibile all'indirizzo: <https://www.cdc.gov/rsv/causes/> (ultimo accesso: marzo 2026). **10.** Azzari C et al. Ital J Pediatr. 2021; 47 (1): 198. **11.** Mira-Iglesias A et al. Influenza Other Respir Viruses. 2022; 16 (2): 328-339. **12.** Società Italiana di Neonatologia (SIN) e Società Italiana Pediatria (SIP). Raccomandazioni sulla prevenzione dell'infezione da VRS. Task force SIP-SIN (luglio 2025). Disponibile all'indirizzo: https://www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2025/09/VRS_raccomandazioni_SIN_SIP_2025.pdf (ultimo accesso: marzo 2026). **13.** Bonanni P et al. Medicine & Drugs. Marzo 2023. **14.** Reeves RM et al. J Infect. 2019; 78 (6): 468-475.

MAT-IT-2600993

sanofi

Consulta il tuo pediatra di fiducia per scoprire i possibili metodi di prevenzione.

Con il patrocinio di



Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)

Consigli utili per i genitori

sanofi

Cos'è il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)?



È un **comune virus respiratorio** che colpisce in particolar modo **i neonati e i bambini nella prima infanzia**.¹



Si trasmette facilmente con tosse, starnuti e stretto contatto fisico, come coccole e baci.²



Costituisce la principale causa di **bronchiolite** e **polmonite** nel neonato nel **primo anno di vita**.²



Oltre il **90%** dei bambini viene infettato dall'RSV **almeno una volta entro i due anni**.¹

Chi può essere infettato?

Non è sempre possibile prevedere quali bambini svilupperanno una forma grave della malattia che richiede **ricovero ospedaliero**.^{3,4}

Tutti i bambini hanno bisogno di essere protetti dall'RSV.⁵



Neonati a termine



Neonati pretermine



Neonati con condizioni cliniche preesistenti

Quali sono i sintomi e come riconoscerli?

I sintomi dell'infezione da RSV sono simili a quelli delle altre infezioni respiratorie.^{2,6}



Raffreddamento come naso chiuso, tosse e febbre



Riduzione dell'appetito nei bambini più grandi o difficoltà nella deglutizione nei più piccoli



Respiro sibilante



In alcuni bambini, l'infezione può progredire in **bronchiolite** e **polmonite** e richiedere il ricovero in ospedale. I sintomi più comuni sono:⁷



Apnea (periodi brevi senza respirare)



Respiro accelerato



Cianosi (colorito blu intorno alle labbra)



Retrazione toracica



Rifiuto dell'alimentazione

Come proteggere il tuo bambino dall'RSV?



La **prevenzione delle malattie da RSV** in tutti i neonati è un'importante priorità per la salute pubblica, in quanto **non è disponibile attualmente una terapia specifica** efficace per il trattamento della malattia da RSV.⁸ È quindi importante **rivolgersi al proprio pediatra** per conoscere le soluzioni di immunizzazione possibili.

Altri consigli utili

Il virus può sopravvivere per ore sulle superfici;² tuttavia, ci sono degli accorgimenti che si possono adottare per aiutare a proteggere i bambini, come:⁹



Lavare frequentemente le mani per almeno 20 secondi



Disinfettare superfici, giocattoli, posate



Tenere i bambini lontani dalle persone che presentano sintomi da possibili infezioni respiratorie

Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo pediatra di fiducia.